

Clé pour les graminées les plus communes des prés et prairies (traduite du néerlandais), appareil végétatif

Pousse en aiguille	Pousse aplatie (jeune feuille pliée)	
	Limbe cannelé	Limbe pas cannelé
<p><i>Festuca ovina</i> – Fétuque ovine Limbe en aiguille. Pousse facile à rouler entre les doigts</p>	<p><i>Lolium perenne</i> – Ray-grass commun Limbe très luisant sur le dessous. Pied rouge. Ligule courte et membraneuse, se ferme quand on tire le limbe en arrière. Souvent clairement 2 oreillettes.</p>	<p><i>Glyceria maxima</i> – Glycérie aquatique Limbe d'une même largeur sur une grande partie de sa longueur. Ligule robuste et pointue. Plante très robuste. Connections transversales entre nervures.</p>
<p><i>Festuca rubra</i> – Fétuque rouge Pousse difficile à rouler entre pouce et index, cahotante. Limbe presque en aiguille. Oreillettes transformées en petites bosses.</p>	<p><i>Cynosurus cristatus</i> – Crételle Limbe gris-vert, dessous moyennement luisant. Ligule courte et solide, pas d'oreillettes. Pied souvent jaune-brun. Resserrement dans le limbe.</p>	<p><i>Dactylis glomerata</i> – Dactyle vulgaire Limbe terne, raide à l'extrémité. Carène bien développée. Ligule longue, blanche et le plus souvent effilochée. Plante en touffes.</p>
	<p><i>Deschampsia cespitosa</i> – Canche cespiteuse Raide et dure. Grossièrement cannelée. Ligule longue et très rigide. Pas d'oreillettes. En touffes rigides.</p>	<p><i>Poa annua</i> – Pâturin annuel Limbe jaune-vert, souvent ondulé. Ligule assez longue et blanche laiteuse. Toujours en fleur.</p>
	<p><i>Glyceria fluitans</i> – Glycérie flottante Limbe très régulièrement cannelé, avec carène étroite et bien visible. Ligule longue, blanche et souvent déchirée. Plante lâche. Connections transversales entre nervures.</p>	<p><i>Poa pratensis</i> – Pâturin des prés Limbe glauque, sommet en capuchon (se fend). Ligule très courte, égale. Pousse rigide. À la lumière, deux lignes claires des deux cotés de la nervure principale sont visibles : 'rails de tram'</p>
		<p><i>Poa trivialis</i> – Pâturin commun Limbe très luisant et vert clair en-dessous. Ligule courte, pointue, membraneuse et verdâtre. Pousses lâches.</p>

	Pousse arrondie	(jeune feuille enroulée)	
avec oreillettes	poilue	sans oreillettes	
		glabre	
		moyennement à fortement cannelée	faiblement cannelée
<i>Festuca pratensis</i> – Fétuque des prés. Dessus du limbe fortement cannelé, dessous très luisant. Ligule courte, verte et rigide. Oreillettes clairement visibles, pied rouge.	<i>Holcus lanatus</i> – Houlque velue. Poils groupés sur les côtes. Ligule longue, blanche. Plante velue au touché. Pied rayé frangé de violet ('pantalon de pyjama')	<i>Agrostis canina</i> – Agrostis des chiens. Ligule longue, aigue et souvent fendue. Pousses fines. Endroits humides	<i>Alopecurus pratensis</i> – Vulpin des prés. Ligue courte, blanche sale et le plus souvent implantée en oblique. Limbe plus étroit à la base qu'au milieu.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> – Flouve odorante. Limbe et gaine plus ou moins poilus. Ligule parfois violette foncée . Oreillettes ciliées. Odeur agréable quand froissée (coumarine – odeur de foin)	<i>Bromus hordeaceus</i> – Brome mou. Entièrement poilu. Poils plus longs que chez la houlque, en ligne sur les côtes. Ligule assez courte, blanche sale. Grosses côtes. Tige parfois un peu violette.	<i>Agrostis stolonifera</i> – Agrostis stolonifère. Ligule bien développée, obtuse, blanche sale. Stolons. Tapis de gazon feutré.	<i>Phleum pratense</i> – Fléole des prés. Limbe généralement ondulé et un peu tordu ('tire-bouchon'). Terne, gris-vert. Ligule bien blanche et dentée.
<i>Hordeum secalinum</i> – Orge faux-seigle. Limbe souvent poilu, dessous légèrement luisant. Ligule courte. Oreillettes assez petites. Tige fortement poilue.	<i>Molinia caerulea</i> – Molinie. Poils au lieu d'une ligule. Limbe poilu sur le dessus, en forme de gouttière. En touffes.	<i>Agrostis capillaris</i> – Agrostis commun. Ligule très courte et blanche sale à violette. Endroits secs.	<i>Phalaris arundinacea</i> – Baldingère. Côtes très discrètes. Ligule longue, membraneuse, blanche sale. Limbes robustes et larges.
<i>Festuca arundinacea</i> – Fétuque roseau. Ligule très rigide, verdâtre, courte. Oreillettes fortement développées et poilues. Pousses généralement rigides, plante grosse et raide.	<i>Arrhenatherum elatius</i> – Fromental. Limbe faiblement et irrégulièrement cannelé, glabre ou poilu. Triangle jaune entre limbe et gaine . Ligule avec des longues dents. Goût amère.	<i>Alopecurus geniculatus</i> – Vulpin genouillé. Ligule longue et aigue. Limbe gris-vert, fortement cannelé. Endroits humides.	
<i>Elymus repens</i> – Chiendent commun. Limbe avec stomates sur le dessous (face abaxiale). Oreillettes embrassant la tige. Parfois poilu. Stolons souterrains.			