





# Plans d'expérience multi-facteurs



# Objectifs/plan du chapitre

---

## Objectifs du chapitre


- Présenter des plans d'expérience pour le traitement de problèmes **multi-facteurs** avec applications industrielles/labo.
- Rester dans un cadre de **facteurs fixes** étudiés dans un milieu expérimental stable avec des **unités expérimentales semblables et indépendantes**.
- Ce cours  $\simeq$  résumé/condensé du cours LSTAT2320 (Plans d'expérience)

## Plan


- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Classes de plans multi-facteurs

# Origine de la planification expérimentale

Les plans d'expériences utilisés en science expérimentale émanent de 3 domaines où les plans d'expériences se sont développés historiquement.



# Etapes d'une recherche expérimentale



---

# Plan du chapitre

---

- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Classes de plans multi-facteurs

# Exemple 1 : Production de maïs (version simple)

## Contexte (cours LBIRA2110)


On s'intéresse à la production de parcelles de maïs pour 3 variétés de maïs et 3 types d'engrais.

18 parcelles ont été cultivées et 9 traitements appliqués aléatoirement à ces 18 parcelles (2 répétitions par traitement).

On ne dit rien sur ces parcelles et sur la période de l'étude → on suppose implicitement que les parcelles sont indépendantes, assez homogènes et représentent bien la population des parcelles à laquelle les résultats de l'étude visent d'être généralisés.

## Plan et données : factoriel complet $3^2$ (= 9) répété deux fois (= 18 expériences)

	Engrais		
Graines	1	2	3
A	110	95	103
	114	100	104
B	96	84	94
	98	85	98
C	94	86	107
	97	87	109



# Exemple 1 : Résultats

## Questions

- Y a-t-il des différences entre engrais ? Entre les variétés ?
- Quel est le meilleur engrais ? Quelle est la meilleure variété ?
- Le meilleur engrais diffère-t-il selon la variété utilisée ?

## Plan et modèle lié

- Plan : factoriel complet  $3^2$  répété deux fois
- Modèle : Anova 2 croisée pour facteurs (catégoriels) fixes

## Résultats statistiques principaux

Analysis of Variance Table

	DF	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Graines	2	432.3	216.2	50.53	1.278e-05
Engrais	2	628	314	73.4	2.676e-06
Graines:Engrais	4	243.7	60.92	14.24	0.0006255
Residuals	9	38.5	4.278	NA	NA

### \$contrasts

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
A - B	11.83	1.19	9	9.910	<.0001
A - C	7.67	1.19	9	6.420	0.0003
B - C	-4.17	1.19	9	-3.489	0.0170

### \$contrasts

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
1 - 2	12	1.19	9	10.049	<.0001
1 - 3	-1	1.19	9	-0.837	0.6905
2 - 3	-13	1.19	9	-10.887	<.0001

# Exemple 2 : Production de maïs (version avancée)

## Contexte et but de l'étude

- Etude de l'impact de la variété de maïs et de l'engrais utilisé sur le rendement d'une culture.
- On s'intéresse à l'évolution de la **taille des plants** en fonction du temps et au **rendement final** d'une parcelle (nb de kg de maïs produit).
- 3 variétés de graines et 3 variété d'engrais sont visés.



## En pratique

- On dispose de **2 champs** (dans des lieux différents)
- On divise chaque champ en **18 parcelles**
- En mesure tous les mois les hauteurs de **4 plants par parcelle**.
- En fin de saison, le rendement de chaque parcelle sera mesuré
- Les expériences sont réalisées sur **une seule année**





# Exemple 2 : facteurs/unité expérimentales/dispositif

## Facteurs d'intérêt et traitements

- Variété (3 niveaux) et Engrais (3 niveaux)
- 9 traitements : plan croisé ou factoriel complet à 2 facteurs  $3^2$

## Unité expérimentales , blocs, répétitions

- 2 champs, 18 parcelles par champs
- $2 \times 18 = 36$  parcelles  $\rightarrow 2 \times 2 = 4$  répétitions possibles par traitement
- 4 plants mesurés par parcelle mesuré chacun 2x : 32 mesures par traitement.

## Répartition des traitements entre les unités expérimentales

- Chaque traitement est testé deux fois par champ
- Les  $2 \times 9$  traitements sont
  - soit alloués aléatoirement aux parcelles des champs
  - soit organisés dans chaque champ selon un dispositif spécial pour éviter une confusion entre de la position de la parcelle et les facteurs d'intérêt.

# Exemple 2: répartition des traitements par champs

Randomisation des essais dans chaque champ					
Champ 1			Champ 2		
V3-E2	V2-E1	V1-E2	V1-E1	V2-E3	V1-E3
V1-E3	V1-E1	V2-E3	V2-E3	V2-E2	V1-E1
V3-E1	V3-E3	V2-E2	V2-E1	V1-E3	V3-E3
V1-E3	V3-E3	V2-E1	V1-E2	V3-E2	V3-E1
V3-E2	V3-E1	V1-E2	V3-E2	V3-E3	V3-E1
V2-E2	V1-E1	V2-E3	V2-E2	V1-E2	V2-E1

Organisation de chaque champ selon une sorte de carré-latin

(champ est divisé en deux blocs et chaque variété/engrais apparait une fois par ligne et une fois par colonne dans chaque bloc)


Champ 1			Champ 2		
V1-E1	V2-E2	V3-E3	V2-E1	V3-E2	V1-E3
V2-E3	V3-E1	V1-E2	V3-E3	V1-E1	V2-E2
V3-E2	V1-E3	V2-E1	V1-E2	V2-E3	V3-E1
V2-E1	V3-E2	V1-E3	V3-E1	V1-E2	V2-E3
V3-E3	V1-E1	V2-E2	V1-E3	V2-E1	V3-E2
V1-E2	V2-E3	V3-E1	V2-E2	V3-E3	V1-E1

# Exemple 2 : modèle (pour un seul champ)


Parcelle



Plant



Mesure



## Modèle complet mixte hiérarchisé

- $Y_{ijklm}$  : hauteur du plant pour les graines  $i$ , l'engrais  $j$ , la parcelle  $k$ , le plant  $l$ , la mesure  $m$
- Modèle :

$$y_{ijklm} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \alpha\beta_{ij} + \delta_{ijk} + v_{ijkl} + \epsilon_{ijklm}$$

- graine et engrais sont des **facteurs fixes**.
- parcelle ( $k$ ), plant ( $l$ ) et mesure ( $m$ ) : **facteurs aléatoires**
- **Hypothèses** sur les facteurs **aléatoires** :

$$\delta_{ijk} \sim iN(0, \sigma_{Par}^2), v_{ijkl} \sim iN(0, \sigma_{Pl}^2), \epsilon_{ijklm} \sim iN(0, \sigma_M^2)$$

## Modèle “pratique” et simple

- $\bar{Y}_{ijk}$  = Moyenne des 8 mesures de la parcelle  $k$
- Modèle

$$\bar{y}_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \alpha\beta_{ij} + \epsilon_{ijk} \text{ avec } \epsilon_{ijk} \sim iN(0, \sigma_T^2)$$

*In fine* les résultats seront comparables

# Exemple 2 : comparaison de 3 modèles

Simulation de plan équilibré avec 288 données : 3 x 3 x 4 x 4 x 2

1 champ, 3 types de graines, 3 engrais, 4 parcelles/GxE, 4 plants/PxGxE et 2 mesures

## Anova 2 (faux) sur les $Y_{ijklm}$

### Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio
Model	8	467.06264	58.3828	33.1104
Error	279	491.95471	1.7633	<b>Prob &gt; F</b>
C. Total	287	959.01735		<b>&lt;.0001*</b>

### Parameter Estimates

Term	Estimate	Std Error	t Ratio	Prob> t
Intercept	14.000417	0.078246	178.93	<b>&lt;.0001*</b>
graine[1]	-0.910625	0.110657	-8.23	<b>&lt;.0001*</b>
graine[2]	0.0067708	0.110657	0.06	0.9513
engrais[1]	-1.083333	0.110657	-9.79	<b>&lt;.0001*</b>
engrais[2]	-0.029479	0.110657	-0.27	0.7901
graine[1]*engrais[1]	0.4201042	0.156493	2.68	<b>0.0077*</b>
graine[1]*engrais[2]	0.2240625	0.156493	1.43	0.1533
graine[2]*engrais[1]	-0.767292	0.156493	-4.90	<b>&lt;.0001*</b>
graine[2]*engrais[2]	-0.195521	0.156493	-1.25	0.2126

### Effect Tests

Source	Nparm	DF	Sum of Squares	F Ratio	Prob > F
graine	2	2	158.03866	44.8139	<b>&lt;.0001*</b>
engrais	2	2	231.63185	65.6822	<b>&lt;.0001*</b>
graine*engrais	4	4	77.39213	10.9728	<b>&lt;.0001*</b>

## Modèle mixte sur les $Y_{ijklm}$

### REML Variance Component Estimates

Random Effect	Var Ratio	Var Component	Std Error
parcelle	1045.4955	2.18465	0.5995736
plant[parcelle]	34.54049	0.0721752	0.0099647
Residual		0.0020896	0.0002463
Total		2.2589148	0.599615

### Parameter Estimates

Term	Estimate	Std Error	DFDen	t Ratio	Prob> t
Intercept	14.000417	0.247373	27	56.60	<b>&lt;.0001*</b>
graine[1]	-0.910625	0.349838	27	-2.60	<b>0.0148*</b>
graine[2]	0.0067708	0.349838	27	0.02	0.9847
engrais[1]	-1.083333	0.349838	27	-3.10	<b>0.0045*</b>
engrais[2]	-0.029479	0.349838	27	-0.08	0.9335
graine[1]*engrais[1]	0.4201042	0.494745	27	0.85	0.4033
graine[1]*engrais[2]	0.2240625	0.494745	27	0.45	0.6543
graine[2]*engrais[1]	-0.767292	0.494745	27	-1.55	0.1326
graine[2]*engrais[2]	-0.195521	0.494745	27	-0.40	0.6958

### Fixed Effect Tests

Source	Nparm	DF	DFDen	F Ratio	Prob > F
graine	2	2	27	4.4837	<b>0.0208*</b>
engrais	2	2	27	6.5716	<b>0.0047*</b>
graine*engrais	4	4	27	1.0978	0.3777

## Anova 2 sur les moyennes $\bar{Y}_{ijk}$

### Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio
Model	8	58.38283	7.29785	3.3128
Error	27	59.47979	2.20296	<b>Prob &gt; F</b>
C. Total	35	117.86262		<b>0.0091*</b>

### Parameter Estimates

Term	Estimate	Std Error	t Ratio	Prob> t
Intercept	14.000417	0.247373	56.60	<b>&lt;.0001*</b>
graine[1]	-0.910625	0.349838	-2.60	<b>0.0148*</b>
graine[2]	0.0067708	0.349838	0.02	0.9847
engrais[1]	-1.083333	0.349838	-3.10	<b>0.0045*</b>
engrais[2]	-0.029479	0.349838	-0.08	0.9335
graine[1]*engrais[1]	0.4201042	0.494745	0.85	0.4033
graine[1]*engrais[2]	0.2240625	0.494745	0.45	0.6543
graine[2]*engrais[1]	-0.767292	0.494745	-1.55	0.1326
graine[2]*engrais[2]	-0.195521	0.494745	-0.40	0.6958

### Effect Tests

Source	Nparm	DF	Sum of Squares	F Ratio	Prob > F
graine	2	2	19.754833	4.4837	<b>0.0208*</b>
engrais	2	2	28.953982	6.5716	<b>0.0047*</b>
graine*engrais	4	4	9.674016	1.0978	0.3777

## Conclusions:

- Anova 2 simple : trop de degrés de liberté, effets trop ou faussement significatifs,
- Modèles mixte et Anova 2 sur moyennes équivalents
- mais le modèle mixte estime les composantes de variance + traite les cas non équilibrés

# Exemple 3 : le problème des pesées


## La question

Déterminer les poids de trois objets A, B et C en quatre pesées et avec un maximum de précision



## Le matériel expérimental

Une balance à deux plateaux à équilibrer avec des poids



**Budget : 4 essais**

# Exemple 4 : étude d'un procédé de fermentation

## Le contexte

Les fermenteurs sont utilisés couramment dans la production de vaccins mais le bon choix de leurs paramètres de réglage est primordial pour assurer une production suffisante, de qualité et stable dans le temps.

## But de l'étude

Rechercher quels facteurs de fermentation ont le plus d'effet sur la biomasse finale obtenue au terme d'une fermentation de 24h ainsi que le sens de ces effets.

**Budget** : Nombre maximum d'essais : 16 (=16 jours)

**Facteurs d'intérêt** : 10 facteurs quantitatifs fixes

**Phase de croissance (0 à 18h)** : X1 - Température de croissance, X2 – Surpression, X3 - Débit d'air , X4 - Vitesse d'agitation X5 – PH, X6 – Débit d'alimentation , X7 – Débit d'antimousse (>16h)

**Phase d'induction (18-24h)** : X8 – Moment d'induction, X9 – Température d'induction, X10 – Débit d'antimousse



# Exemple 5 : Optimisation d'un processus industriel


## Contexte

Etude d'un processus industriel dont le but est de fermer, par soudure, des poches de produit (ex: produits stériles pharmaceutiques ou produits alimentaires)

## But

Trouver les valeurs de la **pression**, de la **température** et de la **durée** de serrage qui optimisent la résistance de la soudure (qui doit être suffisamment résistante mais pas trop pour faciliter l'ouverture) et la qualité visuelle de la soudure

## Processus



---

# Exemple 5 : Les éléments

---

## Les facteurs

- 3 facteurs quantitatifs fixes (temperature, pression, durée)
- Domaines : intervalles continus

## Les unités expérimentales

- Les sachets.
- Pour une application donnée ils sont a priori considérés tous +/- identiques
- On peut considérer que les essais (et unités expérimentales) sont indépendants

## Objectifs de l'étude

- Objectif premier : optimiser le procédé
- Objectif secondaire : comprendre l'effet des facteurs

## Essais, budget, plan, modèle

- Budget : 20 essais. Un essai = un "traitement"
- Quels essais/plan choisir ?
- En quoi un modèle est-il utile ici ?



---

# Plan du chapitre

---

- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Description des problèmes traités dans ce chapitre
- Classes de plans multi-facteurs

# Rappel de vocabulaire

---

## Facteur – critère

Variable d'intérêt de l'étude dont on veut étudier l'effet sur une « réponse ».

Ex: Facteur catégoriel : Type d'engrais, facteur quantitatif : température etc...

Deux types de facteurs dans les modèles : fixe ou aléatoire

## Niveaux/domaine

Valeurs que peut prendre un facteur

Ex: A, B ou C pour la variété ou [120, 180] pour la température

## Unité expérimentale

Objet qui « subit » l'expérience, le traitement: parcelle, animal, juge...

## Traitement

Combinaison de niveaux des facteurs appliquée à une unité expérimentale

Ex: la variété A et l'engrais 2 sont appliqués à une parcelle

## Réponse

Variable observée/mesurée au terme de l'expérience (peut être quantitative/catégorielle ou du comptage)

# Ingrédients d'un design d'expérience

---

- **Les traitements** : quelles combinaisons des niveaux des facteurs d'intérêt seront testés ? = points supports du plan.
- **Répétitions** : Combien de fois chaque essai/traitement sera répété.  
Elles influencent la précision/puissance des résultats statistiques
- **Dispositif expérimental** :
  - Allocation des essais aux unités expérimentales
  - Choix de l'ordre des essais
  - Randomisation/organisation des essais en blocs
- **Modèle à estimer sur les résultats.** Adapté au design et destiné à répondre aux questions posées

# Plan du chapitre

- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Classes de plans multi-facteurs
  - Objectif général
  - Plans factoriels complets
  - Plans factoriels fractionnaires  $2^{k-p}$  et pour le criblage de facteurs
  - Plans pour l'estimation de surfaces de réponse
    - factoriel complet, composite centré, Doehlert, Box Benken

# Objectif général

---

## Motivation

- Quand le nombre de facteurs dépasse 2 ou 3 et/ou que les facteurs sont quantitatifs, le choix de la liste des “traitements” (ou combinaisons de facteurs) à tester n’est pas automatique. **Prendre toutes les combinaisons possibles peut être très coûteux.**
- Dans le milieu industriel “Classique” (chimie, formulation de produits...) ou dans les essais de laboratoire les unités expérimentales sont plus homogènes, l’effet du milieu plus contrôlable et la répétabilité souvent bien meilleure MAIS le nombre de facteurs plus élevé.

## Buts

Proposer des plans (et modèles liés) pour traiter des problèmes impliquant

- un nombre de facteurs + important (>2)
- des facteurs fixes quantitatifs et/ou catégoriels
- dans un but de modélisation mais aussi d’optimisation
- En considérant que la répétabilité est bonne, le milieu contrôlé et les unités semblables et indépendantes.

Matière de modélisation  $\Rightarrow$  modèles linéaires à effets fixes (cours LBIRA2110)

# Plan du chapitre


---

- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Classes de plans multi-facteurs
  - Objectif général
  - Plans factoriels complets
  - Plans factoriels fractionnaires  $2^{k-p}$  et pour le criblage de facteurs
  - Plans pour l'estimation de surfaces de réponse
    - factoriel complet, composite centré, Doehlert, Box Benken


# Plan factoriel complet : définition

Un plan factoriel complet  $l_1 \times l_2 \times \dots \times l_k$  à  $k$  facteurs est un plan formé de toutes les combinaisons des  $l_1, l_2, \dots, l_k$  niveaux de  $k$  facteurs  $X_1, X_2, \dots, X_k$ .

- C'est le plan le **plus utilisé**
- Il s'utilise pour étudier l'effet de **facteurs** quantitatifs et/ou qualitatifs.
- Il sera **répété**  $n$  fois en fonction de la précision désirée pour l'étude.
- Il permet d'estimer un **modèle** avec les effets des facteurs et toutes les interactions possibles entre facteurs. Si le modèle contient des facteurs quantitatifs on peut ajouter des termes quadratiques  $X^2$  ou cubiques  $X^3$  en fonction du nombre de niveaux des facteurs.
- Ces plans sont toujours très bons mais **coûteux** quand le nombre de facteurs augmente.



Plan factoriel complet  $3^2$




Plan factoriel complet  $3 \times 2 \times 2$

# Plans factoriels complets pour 2 et 3 facteurs catégoriels : exemples

## Exemple 1 : Etude de la production de maïs (simplifiée)

Plan factoriel complet à 2 facteurs balancé avec  $n = 2$  répétitions par traitement.

Modèle d'ANOVA 2 croisé (facteurs principaux + interaction)



$$y_{ijk} = \mu_{ij} + \epsilon_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \alpha\beta_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

	GA	GB	GC
E1	n=2	n=2	n=2
E2	n=2	n=2	n=2
E3	n=2	n=2	n=2


## Exemple 5 : Optimisation d'un processus de fermeture de sachets

Plan possible pour explorer le domaine : plan factoriel complet à 3 facteurs  $3^3$

(mais ce n'est pas le seul possible  $\Rightarrow$  affaire à suivre)

Modèle typique estimé sur ce type de plan

$$F = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 P + \beta_3 D + \beta_{12} T.P + \beta_{13} T.D + \beta_{23} PD + \beta_{11} T^2 + \beta_{22} P^2 + \beta_{33} D^2 + \epsilon$$



Autres effets estimables :  $X_i X_j^2, X_i X_j X_k, X_i^2 X_j^2, X_i^2 X_j X_k, X_i^2 X_j^2 X_k, X_i^2 X_j^2 X_k^2$



# Plan du chapitre

---

- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Classes de plans multi-facteurs
  - Objectif général
  - Plans factoriels complets
  - Plans factoriels fractionnaires  $2^{k-p}$  et pour le criblage de facteurs
  - Plans pour l'estimation de surfaces de réponse
    - factoriel complet, composite centré, Doehlert, Box Benken

# Exemple 3 : le problème des pesées


## La question

Déterminer les poids de trois objets A, B et C en quatre pesées et avec un maximum de précision



## Le matériel expérimental

Une balance à deux plateaux à équilibrer avec des poids



**Budget : 4 essais**


## Hypothèses statistiques

- Les mesures sont entachées d'erreurs de variance constante, sont indépendantes et sont entachées d'un biais systématique
- Modèle

$$Y = \text{biais} + \mu + \varepsilon \quad \text{Variance}(\varepsilon) = \sigma^2 \quad \text{Covariance}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$$

# Stratégie 1

On pèse un objet à la fois



À estimer :

$\mu_0$  : Erreur systématique de la balance

$\mu_A$ ,  $\mu_B$  et  $\mu_C$  : les poids des trois objets

Les estimateurs sont notés  $M_0$ ,  $M_A$ ,  $M_B$ ,  $M_C$

Matrice d'expérience

	A	B	C
E1	0	0	0
E2	1	0	0
E3	0	1	0
E4	0	0	1

0 : l'objet n'est pas sur la balance

1 : l'objet est sur le plateau de droite

-1 : l'objet est sur le plateau de gauche

Estimation des poids

$$M_0 = Y1$$

$$M_A = Y2 - Y1$$

$$M_B = Y3 - Y1$$

$$M_C = Y4 - Y1$$

# Quelle est la précision des mesures ?

Chaque pesée  $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$  est entachée d'une erreur  $\varepsilon$  de variance constante  $V(\varepsilon) = \sigma^2$ .

## Estimation des poids

$$M_0 = Y_1$$

$$M_A = Y_2 - Y_1$$

$$M_B = Y_3 - Y_1$$

$$M_C = Y_4 - Y_1$$

## Formules de combinaison de variances

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \mathbf{Cov}(X, Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 \mathbf{Cov}(X, Y)$$

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

## Variances des estimateurs

$$V(M_0) = \sigma^2$$

$$V(M_A) = V(M_B) = V(M_C) = 2\sigma^2$$

**Comment obtenir des mesures plus précises ?**

# Comment obtenir une meilleure précision ?

## Solution possible

Répéter deux fois chaque pesée puis

Calculer la moyenne des résultats

$$M_0 = (Y1 + Y1') / 2$$

$$M_A = (Y2 + Y2') / 2 - (Y1 + Y1') / 2$$

$$M_B = (Y3 + Y3') / 2 - (Y1 + Y1') / 2$$

$$M_C = (Y4 + Y4') / 2 - (Y1 + Y1') / 2$$

## Variance des estimateurs

$$V(M_0) = (V(Y1) + V(Y1')) / 4 = \sigma^2 / 2$$

$$V(M_A) = V(M_B) = V(M_C) = (V(Y2) + V(Y2')) / 4 + (V(Y1) + V(Y1')) / 4 = \sigma^2$$


Et comment faire encore mieux ?

Nombre d'essais	4	8	16	32
$V(MA)=V(MB)=V(MC)$	$2 \sigma^2$	$\sigma^2$	$\sigma^2 / 2$	$\sigma^2 / 4$

**Mais peut-on améliorer la précision sans augmenter le nombre d'essais ?**

# Stratégie 2

Deux objets sont pesés à la fois



Matrice d'expérience

	A	B	C
E1	0	0	0
E2	1	1	0
E3	1	0	1
E4	0	1	1

Système d'équations à résoudre

$$M_0 = Y_1$$

$$M_0 + M_A + M_B = Y_2$$

$$M_0 + M_A + M_C = Y_3$$

$$M_0 + M_B + M_C = Y_4$$

Estimation des poids

$$M_0 = Y_1$$

$$M_A = (Y_2 + Y_3 - Y_1 - Y_4)/2$$

$$M_B = (Y_2 + Y_4 - Y_1 - Y_3)/2$$


$$M_C = (Y_3 + Y_4 - Y_1 - Y_2)/2$$

$$V(M_A) = V(M_B) = V(M_C) = (\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2) / 4 = \sigma^2$$

$$\text{Coût} = N = 4$$

# Stratégie 3

Trois objets sont pesés à la fois



Matrice d'expérience

	A	B	C
E1	1	1	1
E2	-1	1	1
E3	1	-1	1
E4	1	1	-1

Système d'équations à résoudre

$$M_0 + M_A + M_B + M_C = Y1$$

$$M_0 - M_A + M_B + M_C = Y2$$

$$M_0 + M_A - M_B + M_C = Y3$$

$$M_0 + M_A + M_B - M_C = Y4$$

Estimations des poids

$$M_0 = (Y2 + Y3 + Y4 - Y1)/2$$

$$M_A = (Y1 - Y2)/2$$

$$M_B = (Y1 - Y3)/2$$


$$M_C = (Y1 - Y4)/2$$

$$V(M_A) = V(M_B) = V(M_C) = (\sigma^2 + \sigma^2) / 4 = \sigma^2 / 2$$

$$N = 4$$

# Stratégie 4

La première pesée est **inversée**



Matrice d'expérience

	A	B	C
E1	-1	-1	-1
E2	-1	1	1
E3	1	-1	1
E4	1	1	-1

Système d'équations à résoudre

$$M_0 - M_A - M_B - M_C = Y1$$

$$M_0 - M_A + M_B + M_C = Y2$$

$$M_0 + M_A - M_B + M_C = Y3$$

$$M_0 + M_A + M_B - M_C = Y4$$

Estimation des poids

$$M_0 = (Y1 + Y2 + Y3 + Y4)/4$$

$$M_A = (-Y1 - Y2 + Y3 + Y4)/4$$

$$M_B = (-Y1 + Y2 - Y3 + Y4)/4$$

$$M_C = (-Y1 + Y2 + Y3 - Y4)/4$$


$$V(M_A) = V(M_B) = V(M_C) = (\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2) / 16 = \sigma^2 / 4 \quad N = 4$$



# Pourquoi la stratégie 4 est-elle la meilleure ?


## Stratégie 1

	A	B	C
Exp 1	0	0	0
Exp 2	1	0	0
Exp 3	0	1	0
Exp 4	0	0	1




## Stratégie 2

	A	B	C
Exp 1	0	0	0
Exp 2	1	1	0
Exp 3	1	0	1
Exp 4	0	1	1




## Stratégie 3

	A	B	C
Exp 1	1	1	1
Exp 2	-1	1	1
Exp 3	1	-1	1
Exp 4	1	1	-1



## Stratégie 4

	A	B	C
Exp 1	-1	-1	-1
Exp 2	-1	1	1
Exp 3	1	-1	1
Exp 4	1	1	-1



# Reformulation du problème des pesées

## Problème

Etudier (ou PESER) l'effet de **3 facteurs**

(température [100, 200], vitesse [1, 3] et débit [20, 30])

sur le rendement d'une réaction chimique.

## Place de l'objet sur la balance


Objet sur le plateau mode **gauche**  $\Leftrightarrow$  Niveau **minimum** du facteur

Objet sur le plateau de **droite**  $\Leftrightarrow$  Niveau **maximum** du facteur

Objet **hors** de la balance  $\Leftrightarrow$  Niveau **moyen** du facteur


## Stratégie 1 :

Un facteur varie à la fois



## Stratégie 4 :

Plan factoriel fractionnaire



# Écriture du problème des pesées comme un problème de régression linéaire multiple

L'estimation des poids au terme de l'expérience des pesées peut s'écrire sous la forme d'une régression linéaire multiple.

$$Y = X\beta + \varepsilon \quad Y = \mu_0 + \mu_1 X_1 + \mu_2 X_2 + \mu_3 X_3 + \varepsilon$$

Les poids/paramètres sont alors estimés par :  $b = (X'X)^{-1} X'y$

Avec

	Y1			1	-1	-1	-1			$\mu_0$			M0
Y=	Y2		X=	1	-1	1	1		$\beta=$	$\mu_1$		b=	M1
	Y3			1	1	-1	1			$\mu_2$			M2
	Y4			1	1	1	-1			$\mu_3$			M3

Matrice de variance covariance des paramètres :  $V(b) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$

	4	0	0	0			1/4	0	0	0
(X'X)=	0	4	0	0		(X'X) <sup>-1</sup> =	0	1/4	0	0
	0	0	4	0			0	0	1/4	0
	0	0	0	4			0	0	0	1/4

Ce plan est optimal car il fournit des estimations de variance minimum et indépendantes (orthogonalité)

# Exemple 4 : étude d'un procédé de fermentation

## Le contexte

Les fermenteurs sont utilisés couramment dans la production de vaccins mais le bon choix de leurs paramètres de réglage est primordial pour assurer une production suffisante, de qualité et stable dans le temps.

## But de l'étude: Problème de criblage

Rechercher quels facteurs de fermentation ont le plus d'effet sur la biomasse finale obtenue au terme d'une fermentation de 24h ainsi que le sens de ces effets.

**Budget :** Nombre maximum d'essais : 16 (=16 jours)

**Facteurs d'intérêt :** 10 facteurs quantitatifs fixes

Phase de croissance (0 à 18h) :

**X1** - Température de croissance, **X2** – Surpression, **X3** - Débit d'air , **X4** - Vitesse d'agitation **X5** – pH, **X6** – Débit d'alimentation , **X7** – Débit d'antimousse C (>16h)

Phase d'induction (18-24h) :

**X8** – Moment d'induction, **X9** – Température d'induction, **X10** – Débit d'antimousse de C




# Quels sont les plans possibles ?

Modèle classiquement utilisé dans un problème de «criblage»


16 essais, modèle d'ordre 1.  $p = 11 < N = 16$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_{10} X_{10} + \varepsilon$$


Plans possibles pour **3 facteurs**



Factoriel complet  $2^k$



Factoriel complet  $3^k$



1 facteur varie à la fois

Pour **10 facteurs**

Plan factoriel complet à **2 niveaux** : 1024 essais = 3 ans

Plan factoriel complet à **3 niveaux** : 59049 essais = 164 ans

Plan “1 facteur à la fois” : 11 essais → mais pas précis

Plans proposés :

Plan **factoriel fractionnaire  $2^{k-r}$**  à **16 essais** ou  
plan de Plackett et Bruman à 12 essais (non vu).

# Plan factoriel fractionnaire $2^{k-r}$

## Définition

Un plan **factoriel fractionnaire  $2^{k-r}$**  à  $k$  facteurs est un plan résultant de  $r$  fractionnements successifs d'un plan factoriel complet  $2^k$

## Principe du fractionnement

Définir  $r$  « **générateurs** » qui permettent de fractionner successivement le plan en 2 puis 4 puis ....  $2^r$  fractions de  $2^{k-r}$  essais. Une des fractions est utilisée comme plan.

## Générateur

Un générateur est une formule (par exemple  $X_1 X_2 X_3 = 1$ ) qui indique qu'on sélectionne dans le plan de départ les essais tels que le produit  $X_1 X_2 X_3$  des valeurs des facteurs (en valeurs standardisées) est égal à 1.

La partie gauche du générateur est toujours un produit de facteurs et la partie droite vaut 1 ou -1 selon que l'on garde l'une ou l'autre partie du plan.



## Propriétés des plans factoriels fractionnaires $2^{k-r}$

Orthogonaux et de variance minimale mais il faut bien choisir les générateurs.

# Exemples de plans factoriels fractionnaires $2^{4-1}$ à 8 essais



Générateur 1 :  $X_1X_2=1$

Essais	Valeurs standardisées			
	X1	X2	X3	X4
1	-1	-1	-1	-1
4	1	1	-1	-1
5	-1	-1	1	-1
8	1	1	1	-1
9	-1	-1	-1	1
12	1	1	-1	1
13	-1	-1	1	1
16	1	1	1	1





Générateur 2 :  $X_1X_2X_3=1$

Essais	Valeurs standardisées			
	X1	X2	X3	X4
2	1	-1	-1	-1
3	-1	1	-1	-1
5	-1	-1	1	-1
8	1	1	1	-1
10	1	-1	-1	1
11	-1	1	-1	1
13	-1	-1	1	1
16	1	1	1	1



Générateur 3 :  $X_1X_2X_3X_4=1$

Essais	Valeurs standardisées			
	X1	X2	X3	X4
1	-1	-1	-1	-1
4	1	1	-1	-1
6	1	-1	1	-1
7	-1	1	1	-1
10	1	-1	-1	1
11	-1	1	-1	1
13	-1	-1	1	1
16	1	1	1	1



Essais	Valeurs standardisées			
	X1	X2	X3	X4
1	-1	-1	-1	-1
2	1	-1	-1	-1
3	-1	1	-1	-1
4	1	1	-1	-1
5	-1	-1	1	-1
6	1	-1	1	-1
7	-1	1	1	-1
8	1	1	1	-1
9	-1	-1	-1	1
10	1	-1	-1	1
11	-1	1	-1	1
12	1	1	-1	1
13	-1	-1	1	1
14	1	-1	1	1
15	-1	1	1	1
16	1	1	1	1

Ces trois générateurs permettent-ils d'estimer un modèle d'ordre 1 ?

Quel est le générateur le plus adéquat ?

# Tableau de générateurs pour le fractionnement de plans

Quand on doit choisir plus d'un générateur, des tables existent.  
La résolution détermine quel modèle pourra être estimé

R=3 (III) → modèle d'ordre 1 (plus éventuellement qq interactions)

R=4 (IV) → modèle d'ordre 1 et quelques interactions  $X_i X_j$

R=5 (V) → modèle d'ordre 1 et toutes les interactions

$k$	$r$	$N$	Résolution	Générateurs
3	1	4	III	123 = $\pm 1$
4	1	8	IV	1234 = $\pm 1$
5	2	8	III	124 = $\pm 1$ , 135 = $\pm 1$
	1	16	V	12345 = $\pm 1$
6	3	8	III	124 = $\pm 1$ , 135 = $\pm 1$ , 236 = $\pm 1$
	2	16	IV	1235 = $\pm 1$ , 2346 = $\pm 1$
7	4	8	III	124 = $\pm 1$ , 135 = $\pm 1$ , 236 = $\pm 1$ , 1237 = $\pm 1$
	3	16	IV	1235 = $\pm 1$ , 2346 = $\pm 1$ , 1347 = $\pm 1$
8	4	16	IV	2345 = $\pm 1$ , 1346 = $\pm 1$ , 1237 = $\pm 1$ , 1248 = $\pm 1$
9	5	16	III	1235 = $\pm 1$ , 2346 = $\pm 1$ , 1347 = $\pm 1$ , 1248 = $\pm 1$ , 12349 = $\pm 1$
10	6	16	III	1235 = $\pm 1$ , 2346 = $\pm 1$ , 1347 = $\pm 1$ , 1248 = $\pm 1$ , 12349 = $\pm 1$ , 12(10) = $\pm 1$

Voir : Box, Hunter et Hunter : Statistics for experimenters



# Exemple : Plan factoriel fractionnaire : construction



Les 6 générateurs ci-dessous permettent d'extraire **16 essais** du plans factoriel complet à 1024 ( $= 2^{10}$ ) essais

Générateurs :  $G_1: X_1X_2X_3X_5 = 1$      $G_2: X_2X_3X_4X_6 = 1$      $G_3: X_1X_3X_4X_7 = 1$   
 $G_4: X_1X_2X_4X_8 = 1$      $G_5: X_1X_2X_3X_4X_9 = 1$      $G_6: X_1X_2X_{10} = 1$

Plan factoriel fractionnaire $2^{10-6}$										
Facteurs	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	$X_9$	$X_{10}$
Générateurs					123	234	134	124	1234	12
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1
2	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1
3	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1
4	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	1
5	-1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	1
6	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1
7	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1
8	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1
9	-1	-1	-1	1	-1	1	1	1	-1	1
10	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1
11	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	-1
12	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1
13	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1	1	1
14	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1
15	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

# Résultat typique d'un criblage

Le plan de criblage permet uniquement d'étudier si l'effet est présent et son signe




# Plan du chapitre

---

- Remise en contexte
- Exemples traités dans ce chapitre
- Rappel de vocabulaire et des composantes essentielles d'un design d'expérience
- Classes de plans multi-facteurs
  - Objectif général
  - Plans factoriels complets
  - Plans factoriels fractionnaires  $2^{k-p}$  et pour le criblage de facteurs
  - Plans pour l'estimation de surfaces de réponse
    - factoriel complet, composite centré, Doehlert, Box Benken

# Exemple 3 : optimisation d'un processus de soudure




## Question:

Comment explorer le domaine et utiliser la modélisation pour répondre à la question ?

## But :

Rechercher des conditions optimales de fabrication qui assurent


- une **résistance** à la soudure proche de 85 (kg/dm<sup>2</sup>)
- une **qualité visuelle** de la soudure PRINT > 4



# Plans pour « surface de réponse »

## Objectifs de la méthodologie des « surfaces de réponse »

- Étudier le sens, l'amplitude et de la forme des effets de facteurs QUANTITATIFS sur des réponses via un modèle statistique.
- Utiliser le modèle pour réaliser des prédictions et optimisation des réponses.



Modèle visé (le plus souvent) : **Modèle polynomial quadratique complet** (c'est pour ce modèle que les plans RSD classiques sont prévus)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \beta_{11} X_1^2 + \dots + \beta_{kk} X_k^2 + \beta_{12} X_1 X_2 + \beta_{13} X_1 X_3 + \dots + \beta_{(k-1)k} X_{k-1} X_k + \varepsilon$$

pour  $k = 3, p = 10$

Besoin :

Choisir un “bon” plan qui donne des estimations et prédictions précises


# Choix d'une classe de plan possible

## Etape 1


Quels plans sont capables de répondre à la question ?

### Conditions

- Permettre d'estimer le modèle
- Ne pas dépasser le budget disponible.



Plan 1




Plan 2


## Etape 2

Dans les plans possibles, quel plan choisir ?

Il y a-t-il des alternatives ?




Plan 3



Plan 4

# Plans à 3 facteurs pour estimer un modèle d'ordre 2


## Plan factoriel complet $3^k$



Un traitement =  
un point support


$$N = 27$$

## Plan composite centré




$$N = 15$$

## Plan de Doehlert



$$N = 13$$


## Plan de Box et Behnken



$$N = 13$$

Comment choisir un plan ou l'autre ?

# Plan composite centré : définition



C'est le plan le plus utilisé pour l'estimation de modèles quadratiques.

Définition : Un plan composite centré à  $k$  facteurs est composé de

- $N_f$  essais d'un plan factoriel complet ou fractionnaire  $2^{k-r}$  pour estimer les effets principaux et les interactions.
- $2k$  essais en étoile sur les axes à une distance  $\alpha$  du centre du domaine pour estimer les effets quadratiques.
- $n_0$  essais au centre du domaine

Coût :  $N = 2^{k-r} + 2k + n_0$

<b>k</b>	2	3	4	5
<b>n</b>	9	15	25	27
<b>p</b>	6	10	15	21

avec  $N_0=1$



# Comparaison de la qualité des plans

On compare le plus souvent les plans sur base de leur coût, de la qualité des estimateurs des paramètres (puissances) et des prédictions.


Comparaison des plans à 3 facteurs : Composite, Box-Behnken et factoriel avec  $N_0 = 3$  et  $\alpha = 1$  pour le plan composite.

**Power Analysis**

Significance Level: 0.05  
Anticipated RMSE: 1

N=17   N=15   N=29

Term	Anticipated Coefficient	Central Composite Design Power	Box-Behnken Power	3x3x3 Factorial Power
Intercept	1	0.522	0.291	0.632
X1	1	0.774	0.623	0.980
X2	1	0.774	0.623	0.980
X3	1	0.774	0.623	0.980
X1*X2	1	0.681	0.368	0.907
X1*X3	1	0.681	0.368	0.907
X2*X3	1	0.681	0.368	0.907
X1*X1	1	0.294	0.345	0.687
X2*X2	1	0.294	0.345	0.687
X3*X3	1	0.294	0.345	0.687





**Design Diagnostics**

	Efficiency of Central Composite Design Relative to Box-Behnken	Efficiency of Central Composite Design Relative to 3x3x3 Factorial
D-efficiency	1.277	0.564
G-efficiency	1.756	0.632
A-efficiency	1.148	0.525
I-efficiency	1.190	0.579
Additional Run Size	2	-12

Good 1.50 1.25 0.80 0.67 Bad

# Retour à l'exemple 5




$N = 15 + 4 \text{ rép au centre}$

	Temp	Press	Duree	Ts	PS	DS	Bond	Print
1	120	50	0.2	-1	-1	-1	13.2	3.35
2	120	50	2	-1	-1	1	89.85	2.04
3	120	100	1.1	-1	0	0	65.32	3.87
4	120	150	0.2	-1	1	-1	11.25	4.48
5	120	150	2	-1	1	1	89.97	3.01
6	150	50	1.1	0	-1	0	91.45	3.14
7	150	100	0.2	0	0	-1	70.53	3.54
8	150	100	1.1	0	0	0	86.89	3.81
9	150	100	1.1	0	0	0	91.03	3.63
10	150	100	1.1	0	0	0	93.11	3.46
11	150	100	1.1	0	0	0	89.41	3.74
12	150	100	1.1	0	0	0	88.71	3.62
13	150	100	2	0	0	1	80.92	2.46
14	150	150	1.1	0	1	0	93.29	4.36
15	180	50	0.2	1	-1	-1	92.94	2.04
16	180	50	2	1	-1	1	44.53	1.11
17	180	100	1.1	1	0	0	81.55	2.32
18	180	150	0.2	1	1	-1	91.53	2.77
19	180	150	2	1	1	1	41.83	2.07

# Analyse visuelle des résultats (bond)

Que peut-on dire sur l'effet des facteurs ?



# Analyse statistique des résultats

## Résultats expérimentaux

Essais	$\xi_1$	$\xi_2$	Y
1	1	3	86.89
2	4	5	93.29
3	4	1	91.03
4	3	3	91.45
5	5	3	65.32
6	2	5	89.85
7	2	1	13.20
8	3	3	89.97

## Modèle choisi dans l'étape de formalisation

$$Y=f(X_1, X_2, \dots, X_k; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)+\varepsilon$$

Analyse visuelle des résultats

Ajustement du modèle aux données par régression linéaire multiple

Vérification de la **qualité** du modèle

**Interprétation** des effets des facteurs sur les réponses

Utilisation du modèle estimé pour faire des **prédictions**

Recherche de conditions de fabrication **optimales**

# Réponse Bond : Modèle de régression

## Summary of Fit

RSquare	0.997131
RSquare Adj	0.994262
Root Mean Square Error	2.024217
Mean of Response	74.06895
Observations (or Sum Wgts)	19

99.7% de la variance du Bond expliquée par le modèle. 😊

Estimation de l'écart-type des erreurs

## Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio
Model	9	12817.009	1424.11	347.5601
Error	9	36.877	4.10	<b>Prob &gt; F</b>
C. Total	18	12853.886		<b>&lt;.0001*</b>

Le modèle explique quelque chose: au moins un terme est significatif

## Parameter Estimates

Term	Estimate	Std Error	t Ratio	Prob> t
Intercept	41.396	3.612	11.46	<.0001*
Temp	0.276	0.021	12.93	<.0001*
Press	-0.008	0.013	-0.64	0.5378
Duree	7.517	0.711	10.57	<.0001*
(Temp-150)*(Temp-150)	-0.019	0.001	-14.14	<.0001*
(Temp-150)*(Press-100)	-0.000	0.000	-0.40	0.6997
(Press-100)*(Press-100)	0.001	0.000	1.32	0.2188
(Temp-150)*(Duree-1.1)	-1.174	0.027	-44.27	<.0001*
(Press-100)*(Duree-1.1)	0.002	0.016	0.14	0.8946
(Duree-1.1)*(Duree-1.1)	-18.55	1.512	-12.27	<.0001*

Equation du modèle

Termes liés à la pression non-significatifs p-valeur >> 0.05

# Bond: Vérification de la qualité du modèle de régression

Le modèle n'est qu'une « imitation » du phénomène réel.


**Il est donc indispensable de le valider** et de vérifier les hypothèses statistiques sous-jacentes !

*« All models are wrong, but some are useful »*  
(Box)


## Lack Of Fit

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio
Lack Of Fit	5	14.604303	2.92086	0.5246
Pure Error	4	22.272800	5.56820	0.7523
Total Error	9	36.877103		0.9983

L'équation du modèle semble valide car la variance des résidus est proche de la variance expérimentale




Les valeurs prédites par le modèle sont proche des points observés. 😊




Les résidus doivent, si possible, être répartis de manière homogène autour de 0.

# Visualisation du modèle réponse Bond

## Surface de réponse



## Courbes de niveau



# Modélisation de la réponse « Print »

## Summary of Fit


RSquare	0.988508
RSquare Adj	0.977016
Root Mean Square Error	0.135316
Mean of Response	3.095789
Observations (or Sum Wgts)	19

## Lack Of Fit

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Ratio
Lack Of Fit	5	0.09371281	0.018743	1.0547
Pure Error	4	0.07108000	0.017770	<b>Prob &gt; F</b>
Total Error	9	0.16479281		0.4932
				<b>Max RSq</b>
				0.9950

## Parameter Estimates

Term	Estimate	Std Error	t Ratio	Prob> t
Intercept	6.5298247	0.241431	27.05	<.0001*
Temp	-0.021467	0.001426	-15.05	<.0001*
Press	0.01002	0.000856	11.71	<.0001*
Duree	-0.61	0.047545	-12.83	<.0001*
(Temp-150)*(Temp-150)	-0.000591	0.000091	-6.50	0.0001*
(Temp-150)*(Press-100)	-3.417e-5	3.189e-5	-1.07	0.3119
(Press-100)*(Press-100)	4.9258e-5	3.274e-5	1.50	0.1668
(Temp-150)*(Duree-1.1)	0.0053241	0.001772	3.00	0.0148*
(Press-100)*(Duree-1.1)	0.0001944	0.001063	0.18	0.8589
(Duree-1.1)*(Duree-1.1)	-0.773896	0.101063	-7.66	<.0001*





# Optimisation par recherche de zone de compromis

En général les optima individuels des réponses sont contradictoires et il faudra rechercher une ou plusieurs solutions de compromis.

## Principe simple d'optimisation:

Donner pour chaque réponse un objectif et une zone d'acceptation.

Rechercher graphiquement les **zones qui répondent aux critères.**

## Exemple :

Bond : cible = 85 accepté entre 75 et 95,

Print : à maximiser avec un min de 4

## Optimum proposé

Temp = 140, Durée = 1, Pression=150

Bond prédit = 84.8 Print prédit = 4.5

Intervalle de prédiction à 95% :

[79.2,90.3] et [4.12, 4.87]

