



Vision - Vision binoculaire Strabisme

Demet YUKSEL MD PhD

Cliniques Universitaires Saint-Luc, U.C.L.
Institute of Neuroscience (IoNS)



Partie 1 : VISION

- Vision centrale
- Vision périphérique
- Voies visuelles
- Vision binoculaire
- Amblyopie
- Déficiences visuelles
- Voir-Comprendre-Regarder
- Mouvements oculaires



ŒIL~appareil photo

Faisons la comparaison avec un appareil photo

(objectif, diaphragme, chambre noire et pellicule) :


***la cornée** : « hublot » transparent, elle est l'une des lentilles de « l'objectif » de l'œil



***l'iris** joue le rôle du diaphragme, grâce à la pupille, dont le diamètre varie en fonction de la lumière

***le cristallin** : autre lentille de « l'objectif » de l'œil. Sa forme varie, permettant ainsi « la mise au point » loin-près (accommodation)

***la cavité vitrénne** joue le rôle d'une chambre noire



***la rétine** est la « pellicule » de l'œil. Elle transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique; cette dernière sera acheminée vers le cerveau via le nerf optique






Développement par stimulation visuelle normale

AV centrale = FOVEA




Fixation stable






Zone maculaire

zone centrale de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes assurant l'acuité visuelle maximale en éclairage diurne



- ◆ Fovéola (1)
- ◆ Zone avasculaire (2)
- ◆ Fovéa (3)







D'après Provis et al. Arch Ophthalmol, 2008 126: 507-511

Figure IV-13


Subdivision fonctionnelle de la macula en trois secteurs
grâce à leur stimulation spécifique




Cases 60°



Cases 30°



Cases 15°




Damiers vus sous un angle de 15 degrés

Figure IV-16

Acuité visuelle centrale

de loin à 5 m



de près à 30 cm



ŒIL ~ Champ visuel

Left eye visual field

Right eye visual field




•Le scotome, lacune dans le champ visuel d'un ou des deux yeux, central ou périphérique. Il correspond à une lésion de la rétine ou du nerf optique, de toute façon à une lésion pré-chiasmatique.


•Les hémianopsies, il s'agit de la perte de la vision dans la moitié du champ visuel. C'est donc un déficit visuel bilatéral supprimant tout ou partie d'un hémichamp. Malgré l'importance parfois du déficit, l'acuité visuelle centrale n'est pas altérée, elle peut en effet être méconnue du patient.

- Bitemporales : il s'agit le plus souvent d'une atteinte chiasmatique (tumeur hypophysaire)
- Latérales homonymes : elles traduisent toujours une lésion rétro-chiasmatique des voies optiques (souvent hémisphériques). La lésion est toujours du côté opposé à l'hémianopsie
- Quadranopsies : sont en fait des hémianopsies en quadrant supérieur ou inférieur, ayant les mêmes significations que ces dernières

Périmétrie dynamique et statique



œil gauche



œil droit

Vision centrale : normale - Vision périphérique : déficiente
Sujet S. 27 ans atteint de rétinopathie pigmentaire (RP)
Fond d'œil droit et champ visuel Goldmann correspondant





Figure IV-18




L'image rétinienne est
une inversion du champ visuel

Représentation
du champ visuel droit
vers les voies optiques gauches

Magnification
de l'information maculaire
au niveau cortical

Cortical Topography

Cortical magnification



Cortical magnification

Retinal image




Cortical map




Vision binoculaire





(Aus Frisby, 1979)






Befunde aus den Neurowissenschaften Primäre visuelle Verarbeitung Hyperkolumne in V1




Nach Hubel & Wiesel, 1962
Visuelle Kognition WS 01/02 A. Schwaninger

3.9



Neuroscience Fifth Edition(Sinauer)
Neuroanatomy through clinical cases Secind Edition (Sinauer)


Eso → Ortho



Ortho → Eso




Myopia




Cataract





Rétinite pigmentaire




Dégénération maculaire liée à l'âge




Rétinopathie diabétique




Glaucome



Site de la Ligue Braille : www.liguebraille.be



Voie DORSALE
Cortex pariétal postérieur
(traitement spatiaux)



« **WHERE** » pathway

spatial awareness
attention
movement
depth
planning

Voie VENTRALE

Cortex temporal inférieur

(traitement de reconnaissance
visuelle)

« **WHAT** » pathway

object recognition
contrast contour color perception
shape

2 voies parallèles:

Magnocellulaire (voie dorsale)
Parvocellulaire (voie ventrale)

<i>Stimulus</i>	<u>M cellules</u> (magni-larges) Champs récepteurs larges	<u>P cellules</u> (parvi-petites) Champs récepteurs petits
Couleur	Non	Oui(R/V, B/J) -> « <u>couleur</u> »
Luminance	haute -> « <u>formes grossières</u> »	basse
Fréquence spatiale	basse	haute -> « <u>forme</u> »
Fréquence temporelle	haute -> « <u>mouvement</u> »	basse

VOIR

voies afférentes


COMPRENDRE (gnosie)

aires associatives + mémoire + attention

REGARDER (praxie)

oculomotricité

Voie dorsale du mouvement "occipito-pariétale"
(extension de la voie magnocellulaire)
Voie ventrale des formes et couleurs "occipito-temporale"
(extension de la voie parvocellulaire)





Reconnaissance

Aires visuelles
temporales

Voie ventrale

V3
(formes
dyna-
miques)

V4
(formes
et cou-
leurs)

V2

V2

V1

V1

Action

Aires visuelles
pariétales

Voie dorsale

V5
(mouve-
ments)


V3A
(forme)

V2


V2

V1

V1




Vision



Visual Fixation
= Foveal vision







Flx

Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont.


Saccades → shift gaze




- rapid eye movements ($>200^\circ/\text{s}$)
- latency (120msec)
- triggered by retinal position error (P_E)
- no visual feedback
- weak visual perception during saccades




Smooth Pursuit → stabilize gaze




- slow eye movements ($<50^\circ/\text{s}$)
- latency (100msec)
- triggered by retinal velocity error (R_s)
- controlled by visual feedback
- good visual perception during pursuit



Vergence → gain binocular vision



- disconjugate eye movements
- triggered by disparity between both eyes
- controlled by visual feedback
- Aim to keep target on the fovea of both eyes




*de Brouwer, Yuksel, Blohm, Missal and Lefèvre
J Neurophysiol, 87:1646-1650, 2002*




Fixation


Smooth pursuit

Saccades






Sensory processing



Central processing



Motor command





DEFICIENCE VISUELLE

Toujours à évaluer à partir du meilleur œil après correction:

- la mesure de *l'acuité visuelle* (aptitude que possède un œil pour apprécier les détails)
- l'état du *champ visuel* (espace qu'un œil immobile peut saisir)

- + vision de près
- + vision des couleurs
- + vision nocturne

- Une même déficience visuelle peut aussi avoir des retentissements différents selon qu'elle est :
 - * congénitale ou acquise
 - * précoce ou plus tardive
 - * isolée ou associée à d'autres pathologies

Plusieurs façons de « mal voir »

- **Vision totale mais floue** : la perception d'une personne atteinte de cataracte ressemble à celle que l'on peut avoir à travers un verre dépoli (contrastes peu perceptibles, distances mal appréciées, absence de perception du relief, couleurs atténuées et intolérance à la lumière forte).
- **La vision périphérique** : ses atteintes ont pour conséquence un champ visuel extrêmement rétréci comme à travers un tube. C'est le cas de la personne atteinte de rétinite pigmentaire qui ne peut voir que ce qu'elle fixe et plus rien autour : elle pourra lire des caractères suffisamment petits mais sera très gênée dans ses déplacements.
- **La vision centrale** : ses atteintes se traduisent par une tache sur une zone limitée du centre de la rétine ; elles provoquent une altération de la vision des détails et des couleurs. En revanche, les personnes atteintes conservent une bonne perception de l'espace et du mouvement.
- D'autres phénomènes accompagnant la déficience visuelle peuvent avoir des conséquences défavorables sur la vision :
- le **trouble du réflexe de fixation ou nystagmus**
- l'**intolérance à la lumière ou photophobie**
- la **mauvaise vision des couleurs ou dyschromatopsie**

Sévérité du handicap visuel

Malvoyance et cécité

- La limite légale est de 1/20^{ème} malvoyance et cécité.

Malvoyance = « mal-voyant »

- la déficience visuelle moyenne : cdm à 1/20
- la déficience visuelle sévère : cdm à 3 mètres

Plus généralement, on parle de malvoyance pour toute personne dont la baisse d'acuité visuelle est responsable d'une modification de comportement et d'une perte partielle d'autonomie.

Cécité = « non-voyant »

Catégorie I :

La déficience visuelle profonde. En pratique, le sujet compte les doigts à 1 mètre.

Catégorie II :

La cécité presque totale. En pratique, le sujet voit bouger la main à 1 mètre.

Catégorie III :

La cécité absolue. Pas de perception lumineuse, à fortiori absence de l'œil.



AMBLYOPIE fonctionnelle +/- organique

Baisse de vision uni ou bilatérale suite à une déprivation visuelle anormale et/ou une interaction binoculaire anormale

pendant la période critique de développement visuel sans cause organique (+/-) décelable à l'examen clinique de l'oeil.

Celle-ci peut être réversible par des mesures thérapeutiques seulement si elles sont instaurées à temps.

(from von Noorden)



Déprivation visuelle

- Ptosis
- Troubles de milieux (amétropie non-corrigée, taie cornéenne, cataracte, hémorragie du vitré,...)

Interaction binoculaire anormale


- Strabisme
- Parésie oculomotrice
- Déprivation visuelle UNILATERALE

Uni ou bilatérale

Partielle ou complète

Avec ou sans interaction binoculaire anormale


Amblyopic Eye



Normal Eye




Deprivation visuelle




Atrophie colonne cellulaire par dominance « Amblyopie »


-> réversible si traitée à temps, càd pendant la période de maturation visuelle



Deprivation visuelle



Interaction binoculaire anormale



Interaction binoculaire anormale



Interaction binoculaire anormale



PREVENTION & DETECTION de l'amblyopie fonctionnelle

Incidence : 4 à 6%

AVANT l'âge de 2 ans !

Peut être réversible si traitée à temps

Facteurs de risque

- **Histoire familiale**
 - Prematurité
 - Anoxie néonatale
- **Problème neurologique**
 - Tabagisme maternel
- **Prédisposition raciale**





Inspection



- **Comportement avec l'entourage**
 - **Fentes palpébrales**
 - **Asymétrie faciale**
 - **Périmètre crânien**
 - **Taille globe oculaire**
- **Alignement - Nystagmus**
 - **Torticolis**
 - **Taille pupillaire**

Jouets de fixation







10 signes cliniques amblyogènes

Indication de prise en charge spécialisée immédiate

1. Leucocorie




Cataract



Detached Retina



Tumor





Inflammation from infection or parasite



Coloboma

2. Ptosis






3. Exophthalmie



4. Mégalocornée





5. Larmoiement






6. Strabisme








Strabisme et anomalie organique





7. Nystagmus







8. Torticollis



9. Colobome



10. Anisocorie



Traitement

- Traiter la cause
- Lever la déprivation visuelle
- Diminuer l'interaction binoculaire anormale
- Occlusion de l'œil dominant





Partie 2 : STRABISME

- L'ésotropie infantile
- Les autres ésotropies
- Les exodéviation
- Les strabismes restrictifs
- Les strabismes neurogènes et myogènes
- La chirurgie du strabisme


Vision binoculaire

- Evolution chez les vertébrés
- Placement progressif des yeux dans un plan frontal
- Tétrapodes à bipodes
- Développement de la dextérité bimanuelle
- Décussation des voies optiques
- Connexions interhémisphériques : « the split fovea »



INTELLIGENCE AND INSTINCT

Bird's brains are small compared to most mammals, and most birds are poor at learning new skills. However, a bird is born with a huge number of 'programmes' built into its brain. These programmes control not only simple activities like preening and feeding, but also feats of instinct such as migration.



« What is binocular vision for ? A bird's eye view »


Graham R. Martin

October 2009 Journal of Vision

Optic pathways in a **vertebrate with lateralized visual fields and laterally placed forelimbs**

The hemispheres receive practically all, information from the contralateral visual hemifield
CRP is likely to have boosted the lateralization of visually guided limbs


The dominance of contralateral retinal projections (CRP) will reduce the need for inter-hemispheric connections, since visual, motor, tactile, and proprioceptive (ViMoTaPro) information concerning the forelimb are processed in the contralateral hemisphere



a

Optic pathways in **limbless vertebrates**

Each hemisphere receives information from both visual hemifields.




b

Optic pathways in a **primate**

The hemispheres of primates receive visual information solely from the contralateral visual hemifield

In species using forelimbs frontally, modification toward ipsilaterality in the temporal retina is associated with corresponding areas localized in the same hemisphere




c

« *The optic chiasm : a turning point in the evolution of eye/hand coordination* »

Matz Larsson


Zoology 2013

Axonal routing in the optic chiasm is likely to be a reversible process in evolution influenced by the adaptive value of supervising body movements.



« The split fovea »

Evolution naturelle




CENTRAL ORIGINS

Parietal cortex: abnormal motor input from PEF

Frontal cortex: abnormal motor input from FEF and/or SEF

Corpus Callosum: abnormal interhemispheric connections

Superior visual cortical areas: anatomo-functional abnormalities




PERIPHERAL ORIGINS

« Origins of strabismus and loss of binocular vision »

E. Bui Quoc and C. Milleret

Front. Integr. Neurosci.

September 2014



« Recent advances clarifying the etiologies of strabismus »

J. Peragallo, S. Pineles, J. Demer

J. Neuroophthalmol.

June 2015

Table 1. Selected comitant strabismus associated loci

Loci	Inheritance pattern	Ethnicity	Phenotype	PMID
7p22.1(STBMS1)	Recessive	European	Esotropia in infancy or childhood, 7 of 8 affected individuals had various degree of hypermetropia	14519848 [44]
7p22.1(STBMS1)	Dominant	Northern Irish	Primary non-syndromic comitant esotropia	19218600 [45]
16p13.12-p12.3	Recessive	Saudi Arabian	Infantile esotropia and esotropic Duane retraction syndrome	21541264 [93]
4q28.3	Dominant	Japanese	Comitant strabismus	18824738 [47]
7q31.2	Recessive (Imprinting)	Japanese	Comitant strabismus	18824738 [47] 19597570 [94]
6q26	Imprinting	Japanese	Comitant strabismus	19597570 [94]
12q24.32	Imprinting	Japanese	Comitant strabismus	19597570 [94]
19q13.11	Imprinting	Japanese	Comitant strabismus	19597570 [94]





« Strabismus genetics across a spectrum of eye misalignment disorders»
X.C. Ye, V. Pegado, M.S. Patel, W.W. Wasserman
Clinical genetics
March 2014

Examen du strabisme

- Tests de fusion / Tests de stéréoscopie
- Tests de scotomes de suppression / Correspondance rétinienne
- Torticolis monoculaire ODG / binoculaire
- Nystagmus
- Asymétrie faciale
- Mesure A.V : loin / près / monoculaire ODG / binoculaire
- Dominance oculaire / type de fixation / NOC / NVO
- Contrôle de l'accommodation
- Mesure du désalignement oculaire de loin/de près et déviométrie : reflets/prismes/CT
- Syndrome A-V
- Angle objectif / subjectif
- Ecran translucide de Spielmann
- Motilité oculaire intrinsèque et extrinsèque
- Réfraction avec et sans cycloplégie +/- kératométrie
- Segment antérieur et postérieur
- OCT maculaire / étude la couche des fibres nerveuses

1. Strabisme précoce infantile



- ❖ ET grand angle (35DP)
- ❖ HM < + 3.00D
- ❖ Fixation en adduction
- ❖ Fixation croisée (alternance de fixation)
- ❖ DVD / DHD
- ❖ Nystagmus Manifeste Latent
- ❖ Nystagmus Optocinétique asymétrique
- ❖ AV binoculaire > monoculaire ODG

Quel traitement ?

- Chirurgical : Recul Bilatéral Droit Interne
- Avant l'âge de 2 ans
- Développement d'une certaine binocularité
- Effet favorable sur le développement psycho-moteur de l'enfant
- Nécessité de chirurgies complémentaires (par ex. sur la composante verticale)
- Pronostic sensoriel faible si lésions cérébrales type "leucomalacie périventriculaire" : lésions des fibres postérieures des radiations optiques et de l'input binoculaire vers le cortex occipital

2. Strabisme convergent acquis : ESOTROPIE

- Contexte général
- Contexte familial
- Age d'apparition
- Apparition brutale / progressive
- Signes de maladresse
- Dominance oculaire
- Concomitance vs Incomitance

2A. Esotropie accommodative

Fully Refractive
Accommodative Esotropia
ET distance = ET near
normal AC/A ratio




NonRefractive
Accommodative Esotropia
ET distance < ET near
high AC/A ratio

Partial or Decompensated
Accommodative Esotropia
Residual Angle
normal or high AC/A ratio

ORTHOPHORIA
NBV
NO surgery !!!

Controversy
Full correction
Bifocals
Surgery

Variable outcome
Full correction
Surgery




Ortho de loin / ET' de près

ET de loin < ET' de près

Rapport AC/A >

HM ou Myopie (Moyenne : + 2,25 D)



- **R/ Doubles foyers add +2.50 à +3.00D**
- **R/ Recul bilatéral Droit Interne :**
Chirurgie augmentée
+/- anse
+/- myopexie rétroéquatoriale (12-13 mm de l'insertion)

ET résiduelle de loin et de près malgré correction totale HM et malgré add +3.00D

Angle de base sous écran translucide de Spielmann

CRA

amblyopie

HM ou Myopie (Moyenne : + 2,25 D)


R/ lunettes et chirurgie

ET sans correction optique complète

Ortho avec correction optique complète

- Âge de 2-3 ans
- HM moyenne : +5.00D (+3.00D à +10.00 D)
- Amblyopie fréquente / ET angle moyen
- Orthoposition sous écran translucide de Spielmann
- **R/ correction optique complète**


2B. Esotropie non-accommodative



ET acquise normosensorielle



ET secondaire



ET consécutive




Le strabisme
Ma foi, je ne vous reconnais pas !
Ah, c'est que je me suis fait opérer, je ne louche plus, ça me change
tout à fait n'est-ce pas ?
Oh ! tout à fait, car avant vous louchiez en dehors je crois ...

ET d'origine neurologique




ET cyclique



COMITANT

Concomitance n'exclut pas une cause sous-jacente neurologique !

Tumeur cérébrale : cérébelleuse, mésencéphalique, de la région sellaire ou du corps calleux



ET 25-30 PD

ET 25-30 PD

ET 25-30 PD


*céphalées

*maladresse

*ataxie

- Nystagmus / perte du NOC
- Skew / OIN
- Saccades ralenties « floating » / dysmétrie
- Syndrome alphabétique A (ET> reg en haut) / V (ET>reg en bas)
- Absence de fusion motrice

- Pas de TTC
- Pas de limitation d'abduction
- diplopie
- Fermeture d'un oeil



INCOMITANT



(- 2) en version
(- 1) en duction

Ortho

ET 25-30 DP

ET 35-40 DP

ET œil parétique fixant 40-45 DP

>>>


ET œil non-parétique fixant 25-30 DP



TORTICOLIS pour maintien binocularité

Éviter diplopie

Potentiel binoculaire bon



3. Strabisme divergent (XT)

XT précoce infantile



XT tropique (déficit CV)



XT secondaire



XT consécutive



XT d'origine neurologique



X -> X(T) – XT chez l'adulte



$X(T)$ intermittente



- $X(T)$ à mesurer avec relâchement de la fusion et de l'accommodation

- * de loin > 5 m

- * cible non-accomodative

- * CT alterné +++

- * correction totale

- * addition $+ 3.00D$

$X(T) = X'(T)'$: angle de base

$X(T) > X'(T)'$: excès de divergence

$X(T) < X'(T)'$: insuffisance de convergence

Quel traitement ?

- Diminuer la dominance oculaire : occlusion intermittente
- Chirurgical :

Recul Bilatéral Droit Externe / RR / Résection bilatérale Droit Interne

!!! Dangereux avant l'âge de 4 ans

Ne pas créer microstrabisme convergent avec CRA-amblyopie

Taux de récurrence 20 à 30 %


- Peut masquer un dysfonctionnement oblique
- Association fréquente avec troubles de l'attention et de l'apprentissage

4. Strabisme vertical : Parésie congénitale du grand oblique

- TTC de compensation pour maintien de binocularité
- Asymétrie faciale
- Large amplitude de fusion verticale
- Décompensation à l'âge de la presbytie
- Torsion associée
- Syndrome V associé
- Traitement chirurgical quand décompensation

TORTICOLIS OCULAIRE

*Position de la tête permettant d'employer une direction
du regard où la déviation oculomotrice est minime ou absente
et/ou les yeux sont le plus stable*




5. Strabisme restrictif

- Congenital Fibrosis of the ExtraOcular Muscles (CFEOM)
- Congenital Ptosis (CP)
- Duane Retraction Syndrome (DRS)
- Duane Radial Ray Syndrome (DRRS)
- Bosley-Salih-Alorainy Syndrome (BSAS)
- Horizontal Gaze Palsy with Progressive Scoliosis (HGPPS)
- Möbius Syndrome (MS)
- Congenital Familial Facial Weakness CFP (non-ocular cranial nerve involved !!!)


Congenital Cranial Dysinnervation Disorders (CCDDs)
Gutowski 2002 at European Neuromuscular Centre (ENMC)

Congenital Cranial Dysinnervation Disorders



Transcription factors


Cytoskeletal and trafficking proteins



Nucleus	Mendelian Syndrome	Genetic Locus	Gene & protein function
	Ptosis	PTOS1 1p34-p32	
Oculomotor	CFEOM1	FEOM1 12cen	KIF21A (axon guidance)
	CFEOM3	FEOM3 16qter	TUBB3 (axon guidance)
	CFEOM2	FEOM2 11q13	PHOX2A (transcription factor)
Trochlear			
Abducens	Duane	DURS1 8q13	
		DURS2 2q31	CHN1 (axon guidance)
	DRRS	DRRS 20q13	SALL4 (transcription factor)
	HGPPS	HGPPS 11q23	ROBO3 (axon guidance)
	ABDS/BSAS	ABDS/BSAS 7p15	HOXA1 (transcription factor)

Elizabeth Engle is studying the development of cranial nerves and defining genetic disorders that perturb their normal development in humans and model organisms.


They have identified mutations in multiple genes that cause CCDDs.



Congenital Abnormalities Of Cranial Nerve Development

TABLE 1. SYNDROMES WITH CONGENITAL ABNORMALITIES OF CRANIAL NERVES I THROUGH VIII



CRANIAL NERVE	DISORDER	CLINICAL SIGNS	GENE
I	Kallman syndrome	Anosmia, hypopituitarism	<i>KAL1</i> ^{43,45} , <i>FGFR1</i> ⁴⁶
II	Optic nerve hypoplasia	Small optic nerve head, poor vision	None mapped. Familial cases have been reported ⁴⁷
	Septo-optic dysplasia (de Morsier syndrome)	Optic nerve hypoplasia, absent septum pellucidum	<i>HESX1</i> ^{48,49} , <i>PAX6</i> ⁵⁰
III	Congenital third nerve palsy	Ophthalmoplegia, ptosis	None mapped
	Congenital ptosis	Ptosis, isolated	PTOS1 mapped to 1p34.1-p32 ⁵¹ ; PTOS2 mapped to Xq24-q27.1 ⁵¹
	CFEOM1	Ophthalmoplegia, ptosis	<i>KIF21A</i> ⁵²
	CFEOM3	Ophthalmoplegia, ptosis	Gene maps to 16q24 ^{52,53}
IV	Congenital fourth nerve palsy; isolated and familial cases	Ophthalmoplegia	None mapped
			Two reports of familial cases ^{52,53}
III, IV	CFEOM2	Ophthalmoplegia	<i>ARIX</i> ^{55,56}
V	Familial corneal hypesthesia/anesthesia	Decreased corneal sensations	None mapped
			Two families reported ^{54,55}
VI	Duane syndrome type I	Ophthalmoplegia, cocontraction	DRS1, mapped to 2q31 ⁵⁶
VI	Okihiro syndrome	Duane syndrome with radial ray defects	<i>SALLA</i> ^{17,56,57}
VI, II	Duane syndrome and optic nerve hypoplasia	Cocontraction, optic nerve hypoplasia, central incisor	No gene mapped ^{27,28}
VI	Horizontal gaze palsy with progressive scoliosis	Bilateral adduction deficit, progressive scoliosis	One gene mapped to 11q23-25 ⁵⁷
VI (+/- VIII)	Duane syndrome variants, includes Wilderwank syndrome	Various ophthalmoplegia patterns, deafness, other systemic malformations	No genes mapped
VII	Congenital familial facial palsy	Unilateral or bilateral facial weakness	A few families reported ⁵⁸
VI, VII, other	Möbius syndrome	Ophthalmoplegia, facial weakness, other systemic malformations, Poland anomaly, flat foot, microdactyly, polydactyly, paralysis of lower legs with abnormal broad gait. Autism	Several familial instances with autosomal dominant inheritance. ^{59,60} One gene localized to 3q61 Another gene mapped to 10q62





ABDC OD



ABDC OG



- Limitation abduction moins importante en élévation et abaissement
- Up ou Downshoot mécanique en adduction
- Vergence limitée
- Asymétrie faciale si TTC



A	Classification	<u>Complete sixth nerve palsy</u>	DRS type I A → <u>Eso-DRS type I</u>	DRS type I C → <u>Ortho-DRS type I</u>	DRS type I B → <u>Exo-DRS type I</u>
	Motility examination				
	Clinical description	1. Complete limitation of abduction (affected eye doesn't reach the midline) 2. Large angle esotropia in primary position 3. Face turn toward the affected side 4. No palpebral retraction in adduction	1. Complete limitation of abduction (affected eye reaches hardly the midline) and near to normal adduction 2. Small angle esotropia in primary position 3. Face turn toward the affected side 4. Mild palpebral retraction in adduction	1. Mild limitation of abduction and mild limitation of adduction 2. Small angle exotropia in primary position 3. Face turn toward the sound side 4. Marked narrowing of the palpebral fissure in adduction	1. Mild limitation of abduction and mild limitation of adduction 2. Small angle exotropia in primary position 3. Face turn toward the sound side 4. Marked narrowing of the palpebral fissure in adduction

B	Classification	DRS type III → <u>DRS type II</u>	DRS type II → <u>DRS type III</u>	Synergistic divergence = <u>Variant of DRS type II with simultaneous abduction</u>
	Motility examination			
	Clinical description	1. Mild to marked limitation of abduction and marked limitation of adduction 2. Small angle exotropia in primary position 3. Face turn toward the sound side 4. Marked narrowing of the palpebral fissure in adduction	1. Near to normal abduction and complete limitation of adduction 2. Exotropia in primary position 3. Face turn toward the sound side 4. Marked palpebral retraction in adduction	1. No abduction, near to normal abduction, excessive abduction when attempt to adduction 2. Large angle exotropia in primary position 3. Face turn toward the sound side 4. No narrowing of the palpebral fissure on attempted adduction

Möbius syndrome (MS)



6. Strabisme secondaire à

des troubles orbitaires /neurologiques périphériques ou centraux

- Maladie myopique maligne
- Orbitopathie inflammatoire / thyroïdienne / traumatique
- Parésie oculomotrice : III-IV-VI
- Paralysie supra-nucléaire
- Myasthénie
- Désordre vestibulaire



7. Strabisme iatrogène

- Post chirurgie de strabisme
- Post chirurgie ophtalmologique
- Post chirurgie orbitaire
- Post traitement général

