

Clé pour les graminées les plus communes des prés et prairies (traduite du néerlandais), appareil végétatif

Limbe en forme d'aiguille	Préfoliation (jeune feuille) pliée	
	Limbe cannelé (ou nervures bien visibles)	Limbe non cannelé (ou nervures peu visibles)
<i>Festuca rubra</i> – Fétuque rouge Feuille difficile à rouler entre les doigts. Limbes de la base étroits, en aiguille, longs de 40cm. Oreillettes transformées en petites bosses (excroissances) ou absentes. Présence de rhizomes. Bases fibreuses.	<i>Lolium perenne</i> – Ray-grass commun Plante cespiteuse (en touffe), 2.5-8cm de haut. Limbe très luisant à la face inférieure. Base rouge. Ligule courte et membraneuse, verdâtre, se ferme quand on tire le limbe en arrière. Souvent de petites oreillettes, plus développées chez les variétés tétraploïdes. <i>Cynosurus cristatus</i> – Crételle Limbe gris-vert, moyennement luisant à la face inférieure. Ligule courte et rigide, pas d'oreillettes. Base souvent jaune-brune. Limbe souvent rétréci aux 2/3 (resserrement).	<i>Glyceria maxima</i> – Glycérie aquatique Plante très robuste, comme un roseau. Limbe de même largeur sur une grande partie de sa longueur. Ligule blanc sale, robuste et pointue. Connections transversales entre nervures. Pas d'oreillettes.
<i>Festuca ovina</i> – Fétuque ovine Limbe en aiguille. Feuille facile à rouler entre les doigts. Petite taille (5-40cm)	<i>Deschampsia cespitosa</i> – Canche cespiteuse Limbes raides et durs, grossièrement cannelés (nervures très saillantes). Ligule longue et rigide. Pas d'oreillettes. En touffes rigides, souvent isolées. Dans les milieux humides. <i>Glyceria fluitans</i> – Glycérie flottante Limbe très régulièrement cannelé, avec carène étroite et bien visible. Ligule longue, translucide, blanche et souvent déchirée. Connections transversales entre nervures. Pas d'oreillettes. Plante lâche.	<i>Poa annua</i> – Pâturin annuel Plante basse, à port étalé. Limbe jaune-vert, souvent ondulé (accordéon), souvent caréné. Ligule assez longue et blanche laiteuse. Toujours en fleur (floraison continue). <i>Poa pratensis</i> – Pâturin des prés Limbe vert foncé, glauque, assez raide, à sommet en capuchon (se fend). Ligule très courte, blanche. Pousse rigide. À la lumière, deux lignes claires des deux côtés de la nervure principale sont visibles : 'rails de tram' ou 'traces de ski'. <i>Poa trivialis</i> – Pâturin commun Limbe fin (1.5-6mm de large), très luisant et vert clair à la face inférieure. Ligule courte, ou assez longue pointue, membraneuse et verdâtre. Pas de rhizomes mais présence de stolons. Pousses lâches.

Préfoliation (jeune feuille) enroulée			
avec oreillettes	sans oreillettes		
	poilue	moyennement à fortement cannelée	glabre faiblement cannelée
<i>Lolium mutiflorum</i> – Ray-grass d'Italie Port dressé. Limbe très luisant à la face inférieure (10mm de large). Oreillettes très embrassantes. Ligule courte mais aussi haute que la base décolorée du limbe. Base rougeâtre.	<i>Holcus lanatus</i> – Houlque laineuse Poils groupés sur les côtes. Ligule longue, blanche. Plante velue, douce au toucher. Base rayée de violet ('pantalon de pyjama')	<i>Agrostis canina</i> – Agrostis des chiens Ligule longue, aigue et souvent fendue. Pousses fines. Plante gazonnante. Endroits humides.	<i>Alopecurus pratensis</i> – Vulpin des prés Ligule courte, blanchâtre, souvent implantée en oblique. Limbe parfois brillant, plus étroit à la base qu'au milieu. Base rougeâtre.
<i>Festuca pratensis</i> – Fétuque des prés Limbe fortement cannelé à la face supérieure, très luisant à la face inférieure. Ligule verte, rigide et courte (1mm), moins haute que la base décolorée du limbe. Oreillettes clairement visibles. Base rougeâtre. Vigueur moyenne (40-80cm)	<i>Anthoxanthum odoratum</i> – Flouve odorante Plante peu velue, mais souvent une touffe de poils à la jonction du limbe et de la gaine. Limbe et gaine parfois velus. Parfois oreillettes ciliées. Ligule parfois violette foncée. Odeur agréable quand froissée (coumarine – odeur de foin).	<i>Agrostis stolonifera</i> – Agrostis stolonifère Tige grêle. Ligule bien développée, obtuse, blanchâtre. Stolons. Tapis de gazon feutré.	<i>Phleum pratense</i> – Fléole des prés Limbe mat , gris-vert, généralement ondulé et un peu tordu ('tire-bouchon'). Ligule bien blanche et dentée, avec souvent 2 pointes aux extrémités. Tige robuste souvent renflée en bulbe à la base.
<i>Festuca arundinacea</i> – Fétuque élevée Ligule rigide, verdâtre, courte, moins haute que la base décolorée du limbe. Oreillettes fortement développées et poilues. Limbes généralement rigides (10mm de large). Plante de grande taille et raide. Base rouge.	<i>Bromus hordeaceus</i> – Brome mou Entièrement poilu. Poils plus longs que chez la houlque, en ligne sur les côtes. Grosses côtes. Ligule assez courte, blanche sale. Tige parfois un peu violette.	<i>Agrostis capillaris</i> – Agrostis commun Tige grêle. Ligule très courte et blanchâtre (à violet). Parfois ligule plus longue mais asymétrique. Endroits secs.	<i>Phalaris arundinacea</i> – Baldingère Plante robuste, dressée (jusqu'à 2m). Côtes très faibles, discrètes. Ligule longue, membraneuse, blanchâtre. Limbes robustes et larges (presque 2cm). Présence de puissants rhizomes.
<i>Hordeum secalinum</i> – Orge faux-seigle Limbe souvent poilu, face inférieure légèrement luisante. Ligule courte. Oreillettes assez petites. Tige fortement poilue.	<i>Molinia caerulea</i> – Molinie Poils au lieu d'une ligule. Limbe poilu sur la face supérieure, en forme de gouttière à la base. En touffes. Milieux humides	<i>Alopecurus geniculatus</i> – Vulpin genouillé Ligule longue et aigüe. Limbe gris-vert, fortement cannelé. Tige coudée à chaque nœud. Milieux humides.	
<i>Elymus repens</i> – Chiendent commun Limbe mat, glabre ou velu, mais toujours rêche, avec stomates sur le dessous. Oreillettes embrassant la tige. Rhizomes.	<i>Arrhenatherum elatius</i> – Fromental Limbe faiblement et irrégulièrement cannelé, glabre ou poilu. Ligule blanche avec de longues dents. Tige assez grêle. Racines jaune-orange. Triangle jaune entre le limbe et la gaine. Goût amer.		