COENAGRIONIDAE

Tête dessus : espace entre yeux sans tache claire,
ou avec 3 traits étroits
♂ : yeux rouges sauf chez *Erythromma lindenii* (bleu),
non surmontés de noir

Tête dessus : espace entre yeux avec 2 taches claires
(piriformes ou arrondies)
♂ : yeux sans coloration rouge,
surmontés de noir
Coenagrion - ***Enallagma*** - ***Ischnura***

Mâles
Renflement sous S2
2 paires d'AA
(p.13)

Femelles
Ovipositeur
(p.19)

Abdo sans coloration rouge
Th lat avec 2 pts traits sombres
Erythromma
(p.12)

Abdo avec coloration rouge ou jaunâtre
Th lat avec 2 bandes noires couvrant gde
partie de la surface

Pattes rouges à orange-brun
Pt rouge ou blanc-grisâtre
Th dors : BAH claires incomplètes
(pts morceaux de bandes) ou absentes
♂ : abdo rouge
♀ typica : S1 à 3 et S9-10 rouge, S4 à 8 noir
Ceriagrion tenellum (R)
♂ : 26-33 mm - ♀ : 29-34 mm

Pattes noires
Pt noir
Th dors : BAH rouges ou jaunes
entières ou interrompues
♂ : abdo (dors) rouges avec DN sur S7 à 9
♀ typica : S2 à 6 rouge > noir, S7 à 9 noir
Pyrrhosoma nymphula (C)
36-37 mm

Pattes noires et jaunes

Ailes post : base sans tache jaune ou avec pte tache jaune
(pas au-delà du triangle alaire)
Abdo lat avec fine ligne ou trait noir

Th brun clair, sutures à peine marquées
de noir (+ visible près base ailes)
Abdo : S8-9 svt sans trait longit noir
Pattes jaunes à peine marquées de noir
Pt avec bordure noire
♀ : LV à peine saillante
Sympetrum meridionale (ER)
37 - 39 mm



Th avec sutures bien marquées
de noir
Abdo : S8-9 avec trait longit noir
Pattes noires rayées longit de jaune

Ailes post : base avec gde tache jaune
(au-delà du triangle alaire)
Abdo lat avec ligne longit noire continue et épaisse
(♂ : toute la partie inf noire, ♀ : large bande noire)
Pt rouge-brun
♀ : ailes avec zone jaune aussi sous nodus
♀ : LV non saillante
Sympetrum flaveolum (AC)
32 - 37 mm

Aile post : base sans tache jaune
Ailes avec nervures sombres
S. striolatum - ***vulgatum***
(p.45)

Aile post : base avec pte tache jaune (pas au-delà du triangle alaire)
Ailes : ½ base des 4 premières nervures rose ou rouge (♂), jaune (♀)
Yeux lat avec partie inf gris-bleu
Pt jaune bordé de noir à l'avant et à l'arrière
Abdo lat avec ligne longit noire fine et interrompue
♂ : Th lat avec 1 bande blanchâtre
♀ : LV non saillante
Sympetrum fonscolombii (AR)
38 -40 mm



Sympetrum striolatum - vulgatum

Front : ligne noire transverse ne descend pas (ou peu) le long des yeux
Th lat avec 2 bandes jaunâtres bien marquées,
partie inférieure jaune- citron
♂
Abdo rouge-orange, avec variations de couleur,
± cylindrique (largeur S7 = S4)
♀
LV oblique, part de ½ S8,
angle à apex ± 75°
LV (vue ventrale) avec échancrure au milieu
Sympetrum striolatum (C)
42 - 44 mm



Front : ligne noire transverse descend le long des yeux
Th lat sans bandes jaunâtres bien marquées,
svt suffusées de rouge (♂) ou d'olive (♀)
♂
Abdo rouge, plus uni,
élargi en massue (S7 > S4)
♀
LV presque perpendiculaire, part de bord arr S8,
angle à apex < 45°
LV (vue ventrale) sans échancrure au milieu
Sympetrum vulgatum (AC)
35 - 40 mm



Lestes barbarus - Lestes virens

Pt bicolore : base brune, apex jaune blanchâtre (⅓ à ½ du Pt)
BAH jaune, épaisse (svt ¼ de largeur de bande métallique de dessous), atteint base aile ant
Th lat : zone métallique à bord inf presque droit
♂
Abdo : vert métallique à cuivré, pas de cerclage bleu sur S9-10
AAS jaunâtres, apex noir
AAI : extrémités divergent, apex pointus
Yeux : dessus sans bleu
♀
Ovipositeur légèrement dentelé
Lestes barbarus (AR)
40 - 45 mm

Pt brun svt bordé de jaune pâle à base et apex (< à ¼ du Pt)
BAH jaune, étroite, n'atteint pas base aile ant (svt interrompue ou indistincte chez ♂)
Th lat : zone métallique à bord inf légèrement ondulé
♂
Abdo : vert métallique, cerclage bleu pruineux sur S9-10 (plus terne chez ♂ âgés)
AAS noirâtres
AAI : droits à légèrement convergents, apex arrondis
Yeux : dessus bleu
♀
Ovipositeur non dentelé
Lestes virens vestalis (TR)
30 - 39 mm